



Prélèvements au laboratoire, sur rendez-vous

Respecter les **délais d'arrêt de traitement anti-MYCOSIQUE**
(Consulter la liste ci-dessous)

- Arrêt **VERNIS** antifongique : **2 mois** (nettoyer au dissolvant)
- Arrêt **Comprimés** : **2 mois** pour ongles / **15 jours** pour Cheveux et Peau, Intertrigo...
- Arrêt **poudre/lotion/crème** en traitement local : **15 jours**

Traitements anti-mycosique

Vernis :

- MYCOSTER ou ONYTEC (Ciclopirox)
- LOCERYL ou CURANAIL (Amorolfine)

Comprimés :

- LAMISIL ou FUNGSTER (Terbinafine)
- SPORANOX (itraconazole)
- TRIFLUCAN (Fluconazole)
- BEAGYNE (Fluconazole)

Crèmes avulsives :

- AMYCOR ONYCHOSET (Bifonazole)
- ONYSTER (pommade à l'urée 40%)

Crèmes, poudres, sprays :

- AMYCOR
- Dérivés azolés : FONX – ECONAZOLE – FONGAMIL – KETODERME
- FUNGIZONE (Amphotéricine B)
- LAMISIL
- MYCOSTER
- SPORILINE (Tolnaftate)

Merci de suivre les **préconisations ci-dessous** selon la **nature** du prélèvement

Ongles	Cheveux et Barbe
Ne pas couper les ongles 15-20 jours avant RDV	Pas de shampoing 24 à 48H avant le prélèvement.
Retirer tout verni cosmétique 48H avant RDV	<u>Barbe</u> • Arrêt rasage 24 à 48H. • La veille, ne pas « abraser », nettoyer les lésions. Les protéger (compresse, sparadrap) en cas de lésion suintante.
Toilette simple au savon avant de se présenter au laboratoire	

Peau, Plante des pieds, intertrigos	Muqueuses – Visage
24 heures d'arrêt de toute crème ou lotion hydratante localement	<u>Bouche – Langue</u> 24 heures d'arrêt bain de bouche
Pas d'antiseptique/désinfectant sur la zone à prélever	2 heures avant prélèvement : Pas de tabac, Pas d'aliments
Toilette simple au savon avant de se présenter au laboratoire	<u>Lésion du visage</u> Aucun maquillage depuis la veille

Recherche de Sarcopte (Gale)

La veille au soir et le matin du prélèvement, **pas de douche** ni nettoyer ou « abraser » fortement les lésions.

 Contrôle d'une Gale : après un Arrêt d' 1 mois d'Ivermectine comprimés ou crème (STROMECTOL)